Fresnel'sche Formeln

Reflexion von polarisiertem Licht an einer Glasoberfläche

Versuchsaufbau

Messung der Lichtintensität in Abhängigkeit von Polarisation und Reflexionswinkel.

Fresnelsche Formeln (1)

Polarisationsrichtung senkrecht zur Einfallsebene

$$q_{r\perp} = \frac{E_{r\perp}}{E_{e\perp}} = - \frac{\left(\sqrt{n_{\text{rel}}^2 - \sin^2 \alpha} - \cos \alpha \right)^2}{n_{\text{rel}}^2 - 1}$$

$E_{e\perp}$: E -Feld des einfallenden Lichts

$E_{r\perp}$: E -Feld des reflektierten Lichts

$n_{\text{rel}} = \frac{n_2}{n_1}$: relative Brechungszahl

Fresnelsche Formeln (2)

Polarisationsrichtung parallel zur Einfallsebene

$$q_{r||} = \frac{E_{r||}}{E_{e||}} = \frac{n_{rel}^2 \cos \alpha - \sqrt{n_{rel}^2 - \sin^2 \alpha}}{n_{rel}^2 \cos \alpha + \sqrt{n_{rel}^2 - \sin^2 \alpha}}$$

$E_{e||}$: E - Feld des einfallenden Lichts

$E_{r||}$: E - Feld des reflektierten Lichts

$n_{rel} = \frac{n_2}{n_1}$: relative Brechungszahl

Grenzfläche zum optisch dichteren Medium

Reflexionsvermögen q_r
bei senkrecht ($q_{r\perp}$) und
parallel ($q_{r\parallel}$) zur
Einfallsebene
polarisiertem Licht

(Spitziges Minimum beim
Brewsterwinkel (α_p). Falls die
Intensität als Funktion des
Winkels aufgetragen wird,
ergibt sich ein rundes Minimum
(Versuch).

Grenzfläche zum optisch dünneren Medium

Reflexionsvermögen q_r
bei senkrecht ($q_{r\perp}$) und
parallel ($q_{r\parallel}$) zur
Einfallsebene
polarisiertem Licht.